

# URTICÁRIA AGUDA EM PEDIATRIA VERSUS FATORES DESENCADEANTES

CELSO TAQUES SALDANHA celsotaquessaldanha@gmail.com, (UNB); SAMUEL SANTOS ALI (UNIVAG); PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA (UNIVAG); NICOLE VICARI HOLZ (UNIVAG); LAÍS GOMES FERREIRA ROSA (UNIVAG); GUILHERME RIBEIRO DE CERQUEIRA (UNIVAG); MICAELLY FERGUS SILVA CANDIDO (UNIVAG); NATÁLIA GABRIELLI SILVA ALVES (UNIVAG); IGOR GERLIER BORGES DE FARIA (UNIVAG); VICTOR MARQUES FARAH (UNIVAG); LORRAINNE SILVA COELHO DAS NEVES (UNIVAG); RODRIGO DOS SANTOS LIMA (UNB); RAFAEL PIMENTEL SALDANHA (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL); INGRID RIBEIRO COSTA DA MATA (UNB); BEATRIZ BARROS DE MOURA (UFMT); ANA CAROLINA ALVES FELICIANO DE SOUSA SANTOS (UNIVAG).

## Introdução

Urticária aguda é uma condição clínica frequente em atendimentos de emergência pediátrica e são diversos os fatores etiológicos envolvidos, ressaltando-se que pode vir associado com angioedema, inclusive com dispneia, hipertensão arterial ou perda da consciência, caracterizando-se uma anafilaxia.

## Relato de Caso

Genitora ansiosa relata ao médico assistente que seu filho, pré-escolar, 3 anos de idade, nascido de parto cesáreo a termo AIG, nascido de boas condições de vida, sem histórias patológicas pregressas pessoais, previamente hígido, começou a apresentar febre e lesões dermatológicas generalizadas, mais evidentes no tronco. Relatou ainda que procurou atendimento de urgência, sendo diagnosticado infecção viral inespecífica com acometimento da pele. Foi prescrito anti-inflamatório não-esteroidal/AINE (Ibuprofeno), além de anti-histamínico e corticoide oral. Como está no quinto dia de evolução clínica, tendo inclusive

ocorrido desaparecimento da febre, mas com a permanência das lesões cutâneas, a mãe resolveu procurar nova opinião médica, sendo informada, nessa outra ocasião, que as lesões cutâneas são compatíveis com urticárias e de provável etiologia infecciosa viral. Foi suspenso o AINE e mantido somente o uso do anti-histamínico oral com ajuste da dose.

## Comentários

Certamente que o pré-escolar, previamente hígido, teve suas sintomatologias urticariformes desencadeadas pelo quadro infeccioso possivelmente viral, sendo oportuno excluir o AINE (Ibuprofeno), droga frequentemente incriminada como "gatilho" ou mantenedora da situação clínica dermatológica.

## Conclusão

Dentre os fatores desencadeantes das urticárias agudas, as infecções virais ou bacterianas são as principais causas na faixa etária pediátrica, seguida por medicamentos e alimentos.



UnB | HUB



XVII Congresso  
CATARINENSE de  
PEDIATRIA  
IMPACTO DO MUNDO MODERNO  
NA PEDIATRIA  
23 e 24 de abril de 2021 Online